



## Pojęcia stosowane w statystyce publicznej



### Umieralność okołoporodowa

Nazwa angielska: [Perinatal mortality](#)

Definicja:

Wszystkie urodzenia martwe i zgony noworodków zmarłych w pierwszym tygodniu życia, których waga urodzeniowa wynosiła co najmniej 500 g lub (gdy nie jest znany ciężar urodzeniowy) urodzonych po 22 tygodniu trwania ciąży lub osiągających długość ciała co najmniej 25 cm (od szczytu czaszki do pięty).

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Definicja ta zalecana jest przez WHO dla celów krajowych.

Dla celów porównań międzynarodowych zalecane jest ujmowanie noworodków martwo urodzonych i wczesnych zgonów noworodków, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej 1000 g lub (gdy nie jest znany ciężar urodzeniowy) urodzonych po 28 tygodniach trwania ciąży lub osiągających co najmniej 35 cm długości ciała.

Źródło definicji:

- Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja dziesiąta  
*Autor: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)*  
*Miejsce publikacji: Kraków 1994 r.*

Pojęcie nadrzędne:

- [Urodzenie martwe](#)
- [Zgon niemowlęcia](#)

Dziedzina:

Demografia

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:

GUS - Departament Badań Demograficznych

e-mail: [Sekretariat-BD@stat.gov.pl](mailto:Sekretariat-BD@stat.gov.pl)

Zmiany w opisie pojęcia:

- [Umieralność okołoporodowa](#)

*Opis pojęcia który obowiązywał do: 31.12.2017*

