



Zachorowania na niektóre choroby zakaźne



01.10.2025

Gruźlica płuc

Częstotliwość publikacji: roczna

Okres obserwacji: dane roczne

Dostępny szereg czasowy: 2009-2024

Przekrój: Polska; płeć, grupy wieku

Definicje pojęć:

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywołaną przez prątki należące do *Mycobacterium tuberculosis complex*. Najczęstszą postacią gruźlicy jest gruźlica płuc, ale zmiany gruźlicze mogą występować w każdym narządzie ciała (gruźlica pozapłucna).

Wyjaśnienia metodologiczne: Dane dotyczą przypadków zarejestrowanych w ciągu roku (nowe zachorowania i wznowy).

Źródło danych, zestaw danych, gestor: Krajowy Rejestr Zachorowań na Gruźlicę prowadzony przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc; opracowanie wyników badań – Główny Urząd Statystyczny.

Dostępne formaty plików: xlsx, csv

Kiła

Częstotliwość publikacji: roczna

Okres obserwacji: dane roczne

Dostępny szereg czasowy: 2009-2024

Przekrój: Polska; płeć, grupy wieku

Definicje pojęć: Kiła to choroba weneryczna przenoszona drogą płciową wywoływana przez bakterię *Treponema pallidum* (krętka białego). Kiła ma kilka stadiów: kiłę pierwotną (pierwszy etap), kiłę wtórną, kiłę utajoną. Istnieje również kiła wrodzona gdy zakażona matka przenosi kiłę na dziecko w okresie płodowym lub w trakcie porodu.

Wyjaśnienia metodologiczne: Dane dotyczą nowo zarejestrowanych pacjentów w poradniach skórno-

wenerologicznych oraz korzystających z opieki w roku sprawozdawczym.

Wyjaśnienia metodologiczne: Wskaźnik na 100 tys. ludności odnosi się do danej grupy wieku.

Źródło danych, zestaw danych, gestor: Zestaw danych Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia;
opracowanie wyników badań - Główny Urząd Statystyczny.

Dostępne formaty plików: xlsx, csv

Odra

Częstotliwość publikacji: roczna

Okres obserwacji: dane roczne

Dostępny szereg czasowy: 2010-2024

Przekrój: Polska, miasto/wieś, płeć.

Definicje pojęć:

- Odra jest ostrą, wysoce zakaźną chorobą wirusową wywoływaną przez paramyxowirusy. Szczepienie jest jedynym skutecznym środkiem zapobiegającym zachorowaniu na odrę. Może powodować ciężką chorobę, powikłania, a nawet śmierć.
- Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie szerzy się głównie drogą kropelkową oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej. Bardzo rzadko zakażenie następuje drogą pośrednią przez świeżo zanieczyszczone przedmioty.
- Okres wylegania wynosi najczęściej od 10 do 12 dni.

Wyjaśnienia metodologiczne: Dane dotyczą przypadków (B05 klasyfikacji ICD-10) obowiązkowo zgłaszanych przez lekarzy do inspekcji sanitarnej w ciągu roku.

Źródło danych, zestaw danych, gestor: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, Główny Inspektorat Sanitarny Departament Przeciwpidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic; opracowanie danych - Główny Urząd Statystyczny.

Dostępne formaty plików: xlsx, csv

Pliki do pobrania

Gruźlica płuc



[Zachorowania na gruźlicę 2009-2024. Tablice w formacie XLSX](#) 0.04 MB



[Zachorowania na gruźlicę 2009-2024. Tablice w formacie CSV](#) 0.02 MB

Kiła



Zapadalność na kiłę na 100 tys. ludności w latach 2009-2024. Tablice w formacie XLSX 0.04 MB



Zapadalność na kiłę na 100 tys. ludności w latach 2009-2024. Tablice w formacie CSV 0.02 MB

Odra



Zachorowania na odrę 2010-2024. Tablice w formacie XLSX. 0.04 MB



Zachorowania na odrę 2010-2024. Tablice w formacie CSV. 0.01 MB

Tagi